

Zuordnung der Bodenlandschaften Sachsens zu Bodengroßlandschaften


- 02.1 BGL der Auen und Niederterrassen**
 - 02.1.1 Riesa-Torgauer Elbtal
 - 02.1.2 Tal der Vereinigten Mulde
- 04.1 BGL der Grundmoränenplatten und Endmoränen im Altmoränengebiet**
 - 04.1.1 Düben-Dahlener Heide
 - 04.1.2 Niederlausitzer Grenzwall
- 04.3 BGL der Sander und trockenen Niederungssande sowie der sandigen Platten und sandigen Endmoränen im Altmoränengebiet**
 - 04.3.1 Westlausitzer Heide- und Kuppenland
 - 04.3.2 Muskauer Heide
 - 04.3.3 Nieskyer Platten
- 04.5 BGL der Niederungen und Urstromtäler des Altmoränengebietes**
 - 04.5.1 Elsterwerda-Herzberger Elsterniederung
 - 04.5.2 Senftenberger Heide- und Seengebiet
 - 04.5.3 Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft
 - 04.5.4 Rothenburger Neissetal und Muskauer Durchbruch
- 06.2 BGL der Lössböden**
 - 06.2.1 Leipziger Lössstiefeland
 - 06.2.2 Nordsächsisches Lössstief- und Plattenland
 - 06.2.3 Großhainener Lössstiefeland
 - 06.2.4 Großhainener Rödertal
 - 06.2.5 Hallesches Lössstiefeland
 - 06.2.6 Weißenfesler Lössstiefeland
 - 06.2.7 Elster-Luppe-Auen
 - 06.2.8 Bornaer Lössstiefeland
- 06.3 BGL der Lösslandschaften des Berglandes**
 - 06.3.1 Nordwestsächsisches Lösshügel- und Vulkanitkuppenland
 - 06.3.2 Mittelsächsisches Lösshügelland
 - 06.3.3 Mulde-Lösshügelland
 - 06.3.4 Vorerzgebirgisches Becken
 - 06.3.5 Dresdener Elbtalweitung
 - 06.3.6 Westlausitzer Lösshügelland
 - 06.3.7 Oberlausitzer Tieflandrand
 - 06.3.8 Bautzener Lösshügelland
 - 06.3.9 Oberlausitzer Lösshügelland
 - 06.3.10 Zeitz-Altener Lösshügelland
 - 06.3.11 Ronneburger Lösshügelland
- 09.1 BGL mit hohem Anteil an Sand-, Schluff- und Tongesteinen, häufig im Wechsel mit Löss**
 - 09.1.1 Elbsandsteingebirge
 - 09.1.2 Zittauer Gebirge
- 10.2 BGL mit hohem Anteil an sauren bis intermediären Magmatiten und Metamorphiten**
 - 10.2.1 Erzgebirgskamm und obere Lagen
 - 10.2.2 Höheres Westerzgebirge
 - 10.2.3 Östliches Fichtelgebirge
 - 10.2.4 Westlicher Erzgebirgsnordrand
 - 10.2.5 Erzgebirgsnordabdachung
 - 10.2.6 Östlicher Erzgebirgsnordrand
 - 10.2.7 Oberlausitzer Bergland
- 11.1 BGL der Ton- und Schluffschiefer**
 - 11.1.1 Vogtländisches Kuppenland
 - 11.1.2 Elstergebirge
 - 11.1.3 Mehltauer Hochfläche
 - 11.1.4 Thüringer Schiefergebirge

- Bergbaufolgelandschaft**
- BDF Boden-Dauerbeobachtungsfläche
- BFUL Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Sachsen
- BGL Bodengroßlandschaft
- BL Bodenlandschaft

Zuordnung der BDF Sachsens zu den Bodenlandschaften

BL	BDF	BL	BDF	BL	BDF	BL	BDF
02.1.1	2	06.2.2	1, 5, 18	06.3.6	31, 42	10.2.4	46, 50
02.1.2	7	06.2.3	9, 10, 11	06.3.7	20	10.2.5	37, 43, 47, 48, 54
04.1.1	3	06.2.6	22	06.3.8	19	10.2.6	27, 35, 36
04.3.2	12, 13	06.3.1	8, 28, 33	06.3.9	39, 40	10.2.7	32
04.3.3	16, 21	06.3.2	24, 25	09.1.1	38	11.1.1	52
04.5.1	4	06.3.3	29, 41	09.1.2	55	11.1.2	56
04.5.3	14, 15	06.3.4	34, 44, 45	10.2.1	23, 49		
06.2.1	6	06.3.5	26, 30	10.2.2	51, 53		

Benzo(a)pyren im Unterboden der BDF



Erläuterung:

Die angegebene Menge bezieht sich auf eine Fläche von 1 ha und eine Bodenschicht von 20 cm Mächtigkeit.
 1000 g/ha entsprechen 0,3 mg/kg B(a)P (Vorsorgewert nach BBodSchV).
 Benzo(a)pyren wurde nach LUA NRW Merkblatt Nr. 1 bestimmt (BFUL).