

Zuordnung der Bodenlandschaften Sachsens zu Bodengroßlandschaften

- 02.1

BGL der Auen und Niederterrassen
- 02.1.1

Riesa-Torgauer Elbtal
- 02.1.2

Tal der Vereinigten Mulde
- 04.1

BGL der Grundmoränenplatten und Endmoränen im Altmoränengebiet
- 04.1.1

Düben-Dahlener Heide
- 04.1.2

Niederlausitzer Grenzwall
- 04.3

BGL der Sander und trockenen Niederungssande sowie der sandigen Platten und sandigen Endmoränen im Altmoränengebiet
- 04.3.1

Westlausitzer Heide- und Kuppenland
- 04.3.2

Muskauer Heide
- 04.3.3

Nieskyer Platten
- 04.5

BGL der Niederungen und Urstromtäler des Altmoränengebietes
- 04.5.1

Elsterwerda-Herzberger Elsterniederung
- 04.5.2

Senftenberger Heide- und Seengebiet
- 04.5.3

Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft
- 04.5.4

Rothenburger Neissetal und Muskauer Durchbruch
- 06.2

BGL der Lössböden
- 06.2.1

Leipziger Lössstiefeland
- 06.2.2

Nordsächsisches Lössstief- und Plattenland
- 06.2.3

Großhainer Lössstiefeland
- 06.2.4

Großhainer Rödertal
- 06.2.5

Hallesches Lössstiefeland
- 06.2.6

Weißfelfer Lössstiefeland
- 06.2.7

Elster-Luppe-Auen
- 06.2.8

Bornaer Lössstiefeland
- 06.3

BGL der Lösslandschaften des Berglandes
- 06.3.1

Nordwestsächsisches Lösshügel- und Vulkanitkuppenland
- 06.3.2

Mittelsächsisches Lösshügelland
- 06.3.3

Mulde-Lösshügelland
- 06.3.4

Vorerrzgebirgisches Becken
- 06.3.5

Dresdener Elbtalweitung
- 06.3.6

Westlausitzer Lösshügelland
- 06.3.7

Oberlausitzer Tieflandrand
- 06.3.8

Bautzener Lösshügelland
- 06.3.9

Oberlausitzer Lösshügelland
- 06.3.10

Zeitz-Altenburger Lösshügelland
- 06.3.11

Ronneburger Lösshügelland
- 09.1

BGL mit hohem Anteil an Sand-, Schluff- und Tongesteinen, häufig im Wechsel mit Löss
- 09.1.1

Elbsandsteingebirge
- 09.1.2

Zittauer Gebirge
- 10.2

BGL mit hohem Anteil an sauren bis intermediären Magmatiten und Metamorphiten
- 10.2.1

Erzgebirgskamm und obere Lagen
- 10.2.2

Höheres Westerbirge
- 10.2.3

Östliches Fichtelgebirge
- 10.2.4

Westlicher Erzgebirgsnordrand
- 10.2.5

Erzgebirgsnordabdachung
- 10.2.6

Östlicher Erzgebirgsnordrand
- 10.2.7

Oberlausitzer Bergland
- 11.1

BGL der Ton- und Schluffschiefer
- 11.1.1


Vogtländisches Kuppenland
- 11.1.2

Elstergebirge
- 11.1.3

Mehltheuer Hochfläche
- 11.1.4

Thüringer Schiefergebirge
- Bergbaufolgelandschaft

Entwicklung der Benzo(a)pyren-Menge im Unterboden der BDF



Zuordnung der BDF Sachsens zu den Bodenlandschaften							
BL	BDF	BL	BDF	BL	BDF	BL	BDF
02.1.1	2	06.2.2	1, 5, 18	06.3.6	31, 42	10.2.4	46, 50
02.1.2	7	06.2.3	9, 10, 11	06.3.7	20	10.2.5	37, 43, 47, 48, 54
04.1.1	3	06.2.6	22	06.3.8	19	10.2.6	27, 35, 36
04.3.2	12, 13	06.3.1	8, 28, 33	06.3.9	39, 40	10.2.7	32
04.3.3	16, 21	06.3.2	24, 25	09.1.1	38	11.1.1	52
04.5.1	4	06.3.3	29, 41	09.1.2	55	11.1.2	56
04.5.3	14, 15	06.3.4	34, 44, 45	10.2.1	23, 49		
06.2.1	6	06.3.5	26, 30	10.2.2	51, 53		