Daten zum Biotop/Lebensraumtyp		Aufnahmedatum: 22.06.2011		ggf. Ergänzungskartierung:	
Biotop-Name: Waldaußenrand auf dem Lex-Berg					
Biotop-Nr.: 4951§042100	TK 25-Nr.: 4951	FFH-Gebiets-Nr.:	FFH-LRT-ID:		
Ehemalige (WBK2) BID: 4951F0143-	FFH-Gebietsname: Neustadt i. Sa.				
Biotoptyp	§	BT-Code	LRT-Code	% Fläche [m²]	Breite [m] Länge [m]
Strukturreicher Waldrand	☐	WO		100 11749	
Organisatorische Daten					
Kreis: Sächsische Schweiz-	<u>Eigentumsarten</u>	<u>Anteil [ha]</u>	<u>Staof.-Gr.</u>	<u>Anteil [ha]</u>	<u>Höhe [m]</u>
Gemeinde: Stadt Neustadt in	PW	100%	M-V-TM2 [e]	79%	483m
Forstbezirk: Neustadt			M-V-TM3 [e]	21%	
Forstrevier: Neustadt					
Wertbestimmende Gesichtspunkte					
wertvoller Biotopkomplex, Flächengröße, Bedeutung für Biotopverbund					
Beschreibung des Biotops/Lebensraumtyps					
<p>Nach S exponierter mehrstufig aufgebauter, strukturreicher, etwa 15 m breiter Waldaußenrand mit Rotbuche, Gemeine Birke und Stieleiche als Hauptschicht, einzelstammweise gemischt, unterschiedlich dimensioniert; zahlreiche Naturverjüngung der vorkommenden Baumarten. Rotbuche, Stieleiche und Gemeine Birke bis ins starke und sehr starke Baumholz vorkommend. Totholz in geringer Dimensionierung vorkommend. In den Waldrand abgelegte Lesesteine, überwiegend in Wallform, aber auch blockfeldartige Ablagerungen größerer Gesteinsblöcke. Insbesondere in westlich gelegenen Waldstreifen blockfeld-ähnliche Ablagerungen unter starken Rotbuchen am nach Süden abfallenden Hang, hier Bodenvegetation insbesondere von Drahtschmiele, Brennnessel und Rainfarn geprägt. Lesesteinablagerungen häufig bewachsen mit Gräsern und Sträuchern. Ablagerungen von Grasschnitt.</p> <p>Bemerkungen:</p>					
Pflegezustand (bei LRT analog der Bewertung des Erhaltungszustandes) und Pflegehinweise					
Pflegezustand:		Pflegehinweise (keine Angaben für LRT innerhalb von FFH-Gebieten, in diesem Fall siehe FFH-Maßnahmen):			
sehr gut (A)	☐	Totholz belassen. Struktur erhalten und fördern.			
gut (B)	☐				
mittel-schlecht (C)	☐				

Biotop-/Lebensraumtypische Strukturen

Gesamtbewertung Strukturen A B C

Anteil der Mehrschichtigkeit [%] 50

Bewertungen

Anzahl starkes Totholz (liegend+stehend) [Stk.] 0 C

Anzahl an Biotopbäumen [Stk.] 0 C

sonstige Strukturmerkmale

Waldentwicklungsphasen

Waldentwicklungsphase	Wuchsklasse	HS (%)	wS (%)
Jugendphase	Blöße		
	Anwuchs		
	Jungwuchs		
Wachstumsphase	Stangenholz		
	schw. Baumholz		
Reifephase	starkes Baumholz	25	
	sehr st. Baumholz	5	

Anwuchs: h = 0 bis 2m i.d.R. ab Kniehöhe od. gezäunt; Jungwuchs: h = 2 bis 6m;
 Stangenholz: h = 6 bis 20m und BHD ≥ 20cm; schw. Baumholz: BHD 21 bis 40cm;
 starkes Baumholz: BHD 41 bis 60cm; sehr starkes Baumholz: BHD > 60cm;
 HS: Hauptschicht; wS: weitere Schicht

Biotop-/Lebensraumtypisches Arteninventar

Gesamtbewertung Arteninventar A B C

H = Hauptbaumart
 N = Nebenbaumart +
 Pionierbaumart
 F = gesellschaftsfremd

Gehölzartenverteilung "Hauptschicht"

Gehölzartenverteilung "weitere Schichten"

Name (wiss.)	Name (deutsch)	Attribut	Anteil	Name (wiss.)	Name (deutsch)	Attribut	Anteil
Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	H	5				
Betula pendula	Hänge-Birke	H	25				
Fagus sylvatica	Rot-Buche	H	25				
Pinus nigra	Schwarz-Kiefer	F	5				
Populus tremula	Zitter-Pappel	H	5				
Quercus robur	Stiel-Eiche	H	25				

Gesamtbewertung der Gehölzarten

Bodenvegetation

Arten		Arten		Kryptogamen	
Name (wissensch.)	Name (deutsch)	Name (wissensch.)	Name (deutsch)	Name (wissensch.)	Name (deutsch)
Athyrium filix-femina	Wald-Frauenfarn	Galium aparine	Kletten-Labkraut		
Dactylis glomerata	Wiesen-Knäuelgras	Holcus mollis	Weiches Honiggras		
Deschampsia flexuosa	Draht-Schmiele	Hypericum perforatum	Tüpfel-Hartheu		
Digitalis purpurea	Roter Fingerhut	Larix decidua	Europäische Lärche		
Dryopteris carthusiana	Dorniger Wurmfarne	Maianthemum bifolium	Schattenblümchen		
Fraxinus excelsior	Gewöhnliche Esche	Melampyrum sylvaticum	Wald-Wachtelweizen		

Gesamtbewertung der Bodenvegetation

Beeinträchtigungen

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen A B C

Beeinträchtigung	Bewertung	Beeinträchtigung	Bewertung

Bemerkungen: