

Daten zum Biotop/Lebensraumtyp

Aufnahmedatum: 23.09.2015 ggf. Ergänzungskartierung:

Biotop-Name: Waldhang im Wesenitztal westlich Niederhelmsdorf

Biotop-Nr.: 162§000013

TK 25-Nr.:

FFH-Gebiets-Nr.: 162

FFH-LRT-ID:

Ehemalige (WBK2) BID: 4950F0250-

FFH-Gebietsname: Wesenitz unterhalb Buschmühle

Biotoptyp

§ BT-Code LRT-Code % Fläche [m²] Breite [m] Länge [m]

Struktureicher Waldbestand

☐ WR 100 47844**Organisatorische Daten**

Kreis:	Sächsische Schweiz-	Eigentumsarten	Anteil [ha]	Staof.-Gr.	Anteil [ha]	Höhe [m]
Gemeinde:	Stadt Stolpen	PW	100%	U-V-cSM2 []	74%	242m
Forstbezirk:	Neustadt	KW	< 1%	U-V-cSK1 []	15%	
Forstrevier:	Neustadt			U-V-TM2 [g]	11%	

Wertbestimmende Gesichtspunkte

Vorkommen gefährdeter / seltener Pflanzengesellschaften

Beschreibung des Biotops/Lebensraumtyps

Unternr. -:

Struktureicher Waldbestand an einem flachgründigen, steil südexponierten Hang mit kleineren Felsdurchragungen. Die Hainbuche dominiert im Bestand, daneben zahlreiche junge Stiel-Eichen und Birken sowie einzelne Rotbuchen. Strauchschicht und Bodenflora sind nur spärlich vorhanden.

Unternr. 0:

Nördlich der Wesenitz zwischen Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Helmsdorf stockt am nördlichen schwach bis mäßig geneigten Ober- und Mittelhang der Judenleite ein auf halber Fläche mehrschichtiger, lockerer bis geschlossener Buchenmischbestand im schwachen Baumholz. Einzelne Buchen und Eichen am Waldrand befinden sich im starken Baumholz. Eingemischt sind Birke und Eiche. Der Unterstand besteht vorwiegend aus Buchen-Stangenholz, welches auf ca. 50% einen ausreichenden Dichtstand aufweist. Weiterhin kommt vereinzelt Buchen-Jungwuchs vor. Die sehr spärliche Bodenvegetation setzt sich aus lebensraumtypischen Arten sowie Zittergrassegge und etwas Eichen-Naturverjüngung <50 cm zusammen. Im N grenzt ein Feld an. Im umliegenden Bestand fehlt die Buche.

Unternr. 1:

Nördlich der Wesenitz zwischen Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Helmsdorf stockt am nördlichen, stark geneigten Hang im Osten der Judenleite ein auf ganzer Fläche mehrschichtiger, lockerer bis geschlossener Buchenbestand im starken Baumholz mit Beimischung mehrerer lebensraumtypischer Nebenbaumarten. Die Roteiche kommt nur mit sehr wenigen Individuen vor. Der Unterstand besteht fast ausschließlich aus Buchen-Stangenholz. Weiterhin tritt Buchen-Jungwuchs sehr vereinzelt auf. Die spärliche Bodenvegetation besteht aus lebensraumtypischen Arten. Der Bestand weist einiges starkes Totholz, aber keine Biotopbäume auf. Der LRT wird im N von einem Rapsfeld, im S von einem Waldweg begrenzt, der parallel zur Wesenitz verläuft. Im O und W schließt sich bodensaurer Eichenwald an. Der Felsen im O gehört nicht zum LRT.

Bemerkungen: sonstige Beeinträchtigung: Verbiss

Pflegezustand (bei LRT analog der Bewertung des Erhaltungszustandes) und Pflegehinweise

Pflegezustand:

sehr gut (A)

gut (B)

mittel-schlecht (C)

☐
☐
☐

Pflegehinweise (keine Angaben für LRT innerhalb von FFH-Gebieten, in diesem Fall siehe FFH-Maßnahmen):

Naturnahe forstliche Bewirtschaftung.

Biotop-/Lebensraumtypische Strukturen**Gesamtbewertung Strukturen**

A B C

Anteil der Mehrschichtigkeit [%]

60

Bewertungen

Anzahl starkes Totholz (liegend+stehend) [Stk.]

0

B

Anzahl an Biotopbäumen [Stk.]

0

B

sonstige Strukturmerkmale

Waldentwicklungsphasen

Waldentwicklungsphase

Wuchsklasse

HS (%)

wS (%)

Jugendphase

Blöße

Anwuchs

Jungwuchs

Wachstumsphase

Stangenholz

schw. Baumholz

Reifephase

starkes Baumholz

sehr st. Baumholz

Anwuchs: h = 0 bis 2m i.d.R. ab Kniehöhe od. gezäunt; Jungwuchs: h = 2 bis 6m;
 Stangenholz: h = 6 bis 20m und BHD ≥ 20cm; schw. Baumholz: BHD 21 bis 40cm;
 starkes Baumholz: BHD 41 bis 60cm; sehr starkes Baumholz: BHD > 60cm;
 HS: Hauptschicht; wS: weitere Schicht

Biotop-/Lebensraumtypisches Arteninventar**Gesamtbewertung Arteninventar**

A B C

H = Hauptbaumart
 N = Nebenbaumart +
 Pionierbaumart
 F = gesellschaftsfremd

Gehölzartenverteilung "Hauptschicht"**Gehölzartenverteilung "weitere Schichten"**

Name (wiss.)	Name (deutsch)	Attribut	Anteil	Name (wiss.)	Name (deutsch)	Attribut	Anteil
Carpinus betulus	Hainbuche	H	40				
Fagus sylvatica	Rot-Buche	H	10				
Pinus sylvestris	Gewöhnliche Kiefer	F	10				
Quercus robur	Stiel-Eiche	H	40				

Gesamtbewertung der Gehölzarten ☐**Bodenvegetation****Arten****Arten****Kryptogamen**

Name (wissensch.)	Name (deutsch)	Name (wissensch.)	Name (deutsch)	Name (wissensch.)	Name (deutsch)
Calamagrostis arundinacea	Wald-Reitgras	Stellaria holostea	Echte Sternmiere		
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmiele	Vaccinium myrtillus	Heidelbeere		
Luzula luzuloides	Schmalblättrige Hainsimse				
Picea abies	Europäische Fichte				

Gesamtbewertung der Bodenvegetation ☐**Beeinträchtigungen****Gesamtbewertung Beeinträchtigungen**

A B C

Beeinträchtigung	Bewertung	Beeinträchtigung	Bewertung

Bemerkungen: