

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Daten zum Biotop/Lebensraumtyp | | Aufnahmedatum: 08.10.2007 | | ggf. Ergänzungskartierung: | |
| Biotop-Name: Spitzkunnersdorfer Bach und Gehölz | | | | | |
| Biotop-Nr.: | 5054§056324 | TK 25-Nr.: | 5054 | FFH-Gebiets-Nr.: | FFH-LRT-ID: |
| Ehemalige (WBK2) BID: | 5054F0096- | FFH-Gebietsname: | Zittau Nord | | |
| Biotoptyp | <input checked="" type="checkbox"/> § | BT-Code | LRT-Code | % Fläche [m²] | Breite [m] Länge [m] |
| Feldgehölz | <input type="checkbox"/> BA | | | 100 | 3009 |
| Organisatorische Daten | | | | | |
| Kreis: | Görlitz | Eigentumsarten | Anteil [ha] | Staof.-Gr. | Anteil [ha] Höhe [m] |
| Gemeinde: | Oderwitz | | | Uf-BM2 | 100% 302m |
| Forstbezirk: | Oberlausitz | | | | |
| Forstrevier: | Hainewalde | | | | |
| Wertbestimmende Gesichtspunkte | | | | | |
| Bedeutung für Biotopverbund | | | | | |
| Beschreibung des Biotops/Lebensraumtyps | | | | | |
| <p>Der Spitzkunnersdorfer Bach wurde mit Begleitvegetation auf einer Länge von ca. 1 km aufgenommen, vom größeren Waldstück der Abt. 411 bis an den Hofeteich in Mitteloderwitz, unterbrochen von einem Wiesenstück, in dem er geradeaus verläuft und voller Brennessel und Drüsigem Springkraut ist. Der Bach fließt schwach gewunden in einer 1 bis 3 m tiefen Rinne durch Gehölzstreifen u. Wiesenfluren mit vereinzelt Weiden u. Erlen, Eschen, Linden am Bachrand. Eine Tälchensohle ist bei hohen Bachböschungen kaum ausgebildet. An der Nordseite der Teilfläche ne79 verhindert ein Damm Überschwemmungen. Das Bachbett ist unten 1-1,5 m breit. Die Wassertiefe beträgt derzeit 5-20 cm. Wasser ist getrübt. Im Bestockungssaum am Bach u. an den kurzen Hängen ist die Winterlinde stark vertreten, meist mehrstämmig u. im schwachen Baumholz/Stangenholz. Starkbäume der Stieleiche u. einzelner Birken u. Bruchweiden sind enthalten. Schwarz- u. Grauerlen stehen meist direkt am Bach. Stellenweise sind Eschen u. Kirschbäume vorhanden. Die mäßig dichte Strauchschicht insbesondere am Südrand besteht überwiegend aus Holunder u. Hasel. In 3 Weiden sind 4 Buntspecht- u. 2 Halbhöhlen.</p> <p>Bemerkungen:</p> | | | | | |
| Pflegezustand (bei LRT analog der Bewertung des Erhaltungszustandes) und Pflegehinweise | | | | | |
| Pflegezustand: sehr gut (A) <input type="checkbox"/> gut (B) <input type="checkbox"/> mittel-schlecht (C) <input type="checkbox"/> | | Pflegehinweise (keine Angaben für LRT innerhalb von FFH-Gebieten, in diesem Fall siehe FFH-Maßnahmen): | | | |

